

dr inż. Zenon Zbąszyniak  
 Politechnika Poznańska  
 Instytut Matematyki

## Punkty ekstremalne w przestrzeni dualnej do przestrzeni Musielaka-Orlicza

W pracy zostały pokazane kryteria określające punkty ekstremalne dla przestrzeni dualnej do funkcyjnej przestrzeni Musielaka-Orlicza. Podstawowe pojęcia występujące w pracy scharakteryzowano poniżej.

Niech  $X^*$  oznacza przestrzeń sprzężoną do przestrzeni Banacha  $X$ ,  $B(X)$  kulę jednostkową a  $S(X)$  sferę jednostkową w  $X$ .

Niech  $A$  będzie wypukłym podzbiorem przestrzeni  $X$ . Punkt  $x \in A$  nazywamy *punktem ekstremalnym* zbioru  $A$ , gdy dla dowolnych  $y, z \in A$  równość  $x = (y+z)/2$  implikuje  $y = z$ .

Przestrzeń  $X$  nazywamy *ściśle wypukłą*, gdy zbiór wszystkich punktów ekstremalnych kuli  $B(X)$  jest równy sferze  $S(X)$ .

Funkcjonał  $f \in S(X^*)$  nazywamy *funkcjonałem podparcia* w punkcie  $x \in S(X)$ , gdy  $f(x) = \|x\| = 1$ .

Dla dowolnej funkcji Musielaka-Orlicza  $\Phi$  definiujemy na  $L^0$  funkcjonał  $I_\Phi$  wzorem  $I_\Phi = \int_T \Phi(t, x(t)) d\mu$ .

*Przestrzeń Musielaka-Orlicza* określamy jako zbiór elementów  $x \in L^0$ , dla których  $I_\Phi(\lambda x) < +\infty$  przy pewnym  $\lambda > 0$  zależnym od  $x$ .

W przestrzeni tej wprowadzamy tzw. *normę Luxemburga* postaci

$$\|x\|_\Phi = \inf\{\lambda > 0 : I_\Phi(x/\lambda) \leq 1\}$$

lub *normę Orlicza* daną wzorem *Amemiyi*

$$\|x\|_\Phi^O = \inf_{k>0} \frac{1}{k} \{1 + I_\Phi(kx)\}.$$

Przy każdej z tych norm przestrzeni Musielaka-Orlicza jest przestrzenią Banacha.

Kryterium uzyskane w pracy wykorzystuje dekompozycję funkcjonału w przestrzeni dualnej oraz własności pewnego modularu wypukłego określonego na części regularnej i singularnej funkcjonału.